



I DENTI DEL GIUDIZIO: CHI, COME, PERCHE' E QUANDO...




I problemi derivanti dai denti inclusi comprendono il dolore, le infezioni, l'affollamento dei denti e la perdita d'osso o gengiva, come pure danni ai denti vicini o ad altre strutture, per non dimenticare eventuali compartecipazione all'insorgenza di altri disturbi di salute: cisti, tumori possono insorgere dallo sviluppo di un terzo molare, necessitando quindi un tipo di chirurgia molto più massiccia.

Non è comunque necessario che i denti del giudizio siano inclusi per dare problemi: solitamente a causa della posizione e per la loro scarsa funzionalità risulta difficile pulirli. Senza una fuoriuscita completa dei denti del giudizio e delle gengive sane attorno a questi, nelle tasche si sviluppano batteri ed aumenta la possibilità di infezioni. Il dolore è il tipico disturbo che si percepisce quando il dente erompe e potrebbe essere anche un dolore importante. Ovviamente le complicazioni sono difficili da prevedere: più tempo il dente del giudizio resterà in sede, più sarà probabile che insorgeranno problemi ad esso connessi. La miglior prevenzione, quindi, è rimuoverlo durante l'adolescenza.



Per valutare la posizione del dente del giudizio ed eventuali problemi, deve essere fatta una breve consultazione con esami orali e radiografici: il chirurgo potrà spiegarti la procedura e la guarigione dall'estrazione del dente così come potrà rispondere a tutte le domande che si hanno in merito.

Il tempo ottimale per rimuovere un dente del giudizio è generalmente a metà adolescenza: lo sviluppo della radice in quel tempo non è ancora completa e la rimozione quindi genera meno fastidio e ha una veloce guarigione: la cura e la chiusura sono agevolate.



La rimozione del dente del giudizio è una procedura ambulatoriale di routine fatta in studio generalmente sotto anestesia. Per l'anestesia generale è onvece richiesta tutta l'anamnesi medica del paziente. Il paziente non deve mangiare o bere almeno 6 re prima dlel'intervento e è richiesto l'accompagnatore.